

AGRESSION SEXUELLE EN ENFANCE ET ALLIANCE THÉRAPEUTIQUE : LE RÔLE MODÉRATEUR DE LA DISSOCIATION

ANNE-JULIE LAFRENAYE-DUGAS

SEXOLOGUE M.A. ET PSYCHOTHÉRAPEUTE
CANDIDATE AU DOCTORAT EN SEXOLOGIE

Natacha Godbout, Ph.D. et Martine Hébert, Ph.D.

Colloque annuel du CRIPCAS

INTRODUCTION ET PROBLÉMATIQUE

- **Agression Sexuelle en Enfance (ASE)** → Expérience de violence interpersonnelle fréquemment rapportée :
 - 18% des femmes et 8% des hommes de la population générale (Stoltenborgh et al., 2011).
 - 56% des femmes et 37% des hommes consultant en sexothérapie (Berthelot et al., 2014).
- **Symptômes dissociatifs** → Perturbations des fonctions psychologiques qui sont normalement intégrées, comme la conscience, la mémoire, ou l'identité (APA, 2013).
- **Alliance thérapeutique** → Composante clé dans l'efficacité des traitements (Baillargeon, Pinsof et Leduc, 2005).



MÉTHODOLOGIE

PARTICIPANTS

N	199
Genre	111 femmes (56%) ; 88 hommes (44%)
Âge	M = 39 ans (E.T. = 12,5 ; 19 à 73 ans)
Revenu	68% revenu inférieur à 40 000\$
Scolarité	81% niveau d'étude post secondaire
Occupation	61% sur le marché du travail
Lieu	93% originaires du Canada
42% : Victimes d'ASE	
36% : Niveau problématique ou élevé de dissociation	

OUTILS DE MESURE

ASE	Items dérivés d'études portant sur la maltraitance (Bremner et al., 2007 ; Briere et Runtz, 1990 ; Briere et al., 2012 ; Godbout et al., 2009 ; Godbout, Lussier et Sabourin, 2006 ; Godbout et al., 2011 ; Vaillancourt-Morel et al., 2015)
Symptômes dissociatifs	Sous-échelle du Trauma Symptom Inventory-2 (Briere, 2011)
Alliance thérapeutique	Working Alliance Inventory-Client Short Form (Tracey & Kokotovic, 1989)


RÉSULTATS : ANALYSES DE RÉGRESSION

MODÉRATION DU LIEN ENTRE LA PRÉSENCE D'ASE ET L'ALLIANCE THÉRAPEUTIQUE PAR LE NIVEAU DE DISSOCIATION

VD = WAI	<i>p</i>	<i>A</i>	<i>Bêta</i>	<i>r</i> ²	Δr^2
ASE	0,197	1,789	0,091		
Dissociation	0,535	0,527	0,054		
ASE X Dissociation	0,036*	-3,050	-0,185		
Bloc :					
1. ASE				0,007	0,007
2. Ajout : Dissociation				0,010	0,003
3. Ajout : Interaction				0,032	0,022


RÉSULTATS : GRAPHIQUE

MODÉRATION DU LIEN ENTRE LA PRÉSENCE D'ASE ET L'ALLIANCE THÉRAPEUTIQUE PAR LE NIVEAU DE DISSOCIATION



IMPLICATIONS CLINIQUES

- Haut niveau d'adultes consultant en sexothérapie rapportant des ASE et des symptômes dissociatifs.
 - Les victimes d'ASE avec peu de dissociation tendent à créer une meilleure alliance thérapeutique.
- En traitement sexothérapeutique → Cibler la dissociation pourrait être bénéfique (p. ex., à l'aide d'exercices de présence attentive).
- Formation clinique et continu des sexothérapeutes.



MERCI DE VOTRE ÉCOUTE

Et sincères remerciements :

- Aux co auteurs
- À l'équipe de l'Unité de recherche et d'intervention sur le **TRA**uma et le **Couple** (**TRACE**) qui rend la collecte de données possible
 - Aux stagiaires de sexologie clinique et à leurs clients pour leur participation

Pour toute information : lafrenaye-dugas.anne-julie@courrier.uqam.ca